

# COVID-19 Očkovanie

## DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

Očkovanie je na Slovensku bezplatné. Očkujú sa ľudia starší ako 18 rokov. Všetky informácie o očkovaní nájdete na [www.korona.gov.sk](http://www.korona.gov.sk)



### KTO MÔŽE POŽIADAŤ O OČKOVANIE

Požiadat o očkovanie môžu všetci, ktorí patria do aktuálne otvorenej fázy alebo do predchádzajúcich fáz očkovania.



### KDE SA MÔŽEM DAŤ ZAOČKOVAŤ

Očkovanie proti ochoreniu COVID-19 prebieha vo vakcinačných centrách zriadených vo všetkých okresoch SR.



### KOLKOKRÁT SA MUSÍM ZAOČKOVAŤ

Vakcíny proti ochoreniu COVID-19 sú zatiaľ podávané v dvoch dávkach. Termín na podanie druhej dávky vakcíny vám bude pridelený automaticky. Ak ste ochorenie COVID-19 už prekonali, nasledujúcich 90 dní by vaše telo malo mať protilátky na tento vírus. Na očkovanie sa môžete zaregistrovať po uplynutí tohto obdobia.



### POSTUP PRI REGISTRÁCI

Zistite, do ktorej skupiny obyvateľov patríte a ktorá fáza je aktuálne otvorená. Ak je otvorená fáza pre vašu skupinu, požiadajte o očkovanie na webovej stránke [www.old.korona.gov.sk](http://www.old.korona.gov.sk)

Treba vyplniť: osobné a kontaktné údaje, adresu, skupinu, do ktorej patríte, preferované miesto, kde a kedy sa chcete dať zaočkovať podľa kraja alebo mesta.

Čas vám bude pridelený v termíne, ktorý si zvolíte. Ak sú všetky miesta vo vakcinačnom centre, ktoré ste si vybrali obsadené, skúste registráciu v iný deň.



## AKO SA SPRÁVAŤ PO ZAOČKOVANÍ

Ak ste už zaočkovaní, informujte svojho všeobecného lekára. Ukážte mu alebo zašlite kópiu záznamového lístka o očkovaní.

48 hodín po očkovaní sa odporúča oddychovať. Vyhnite sa fyzickej záťaži a požívaniu alkoholu.

Po podaní prvej dávky naďalej dodržiavajte ochranné opatrenia a prísne sa chráňte pred prípadnou nákazou. Ak sa zo závažných dôvodov nebudete môcť dostať na podanie 2. dávky, preobjednajte sa na iný termín.



## MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Prvé 2-3 dni po očkovaní môžete mať mierne zvýšenú teplotu. Ak je vaša teplota nad 38 °C, môže to znamenať, že máte COVID-19 alebo inú infekciu. Kontaktujte svojho lekára.

Po očkovaní môžete mať začervenanie v mieste vpichu a opuch lymfatických uzlín.

V prípade bolesti a vyššej teploty užite niektorý z liekov obsahujúcich paracetamol napr. Panadol, Paralen a pod. (postupujte podľa pokynov v príbalovom letáku), aby ste sa cítili lepšie.

Príznaky zvyčajne trvajú menej ako týždeň. Ak sa vaše príznaky zhoršia alebo máte obavy, kontaktujte svojho lekára.



## ČO ROBIŤ, KEĎ SA NAKAZÍTE MEDZI OČKOVANÍM

Ak cítite slabosť, únavu, bolesť tela niekoľko dní po prvom očkovaní, mali by ste sa dať pretestovať. Je totiž možné, že ste sa či už tesne pred očkovaním alebo po ňom infikovali koronavírusom. V takomto prípade by však mal byť priebeh infekcie miernejší.



## KEDY BY STE SA NEMALI DAŤ OČKOVAŤ

Ak máte akútne zápalové alebo horúčkové ochorenie, zaočkovať by ste sa mali dať až po uzdravení. Prechladnutie bez zvýšenej teploty nie je pre vakcináciu prekážkou.

Ak trpíte alergiou na niektorú zo zložiek vakcíny, vopred sa informujte u svojho lekára.

Ak sa u vás po prvej dávke vakcíny prejavila extrémne silná alergická reakcia.



## OČKOVANIE BY STE MALI NECHAŤ NA POSÚDENIE LEKÁROV

Ak užívate lieky na riedenie krvi, trpíte zníženým počtom krvných doštičiek alebo máte poruchu zrážania krvi.

Ak patríte medzi obzvlášť zraniteľných pacientov, ktorých zdravotný stav je natoľko kritický, že by vaše telo nemuselo očkovanie zvládnuť.